


سؤالات امتحان نهایی درس: ریاضی (۳)	رشته ی : علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان : ۱۲۰ دقیقه
سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان : ۱۳۹۲ / ۶ / ۶	تعداد صفحه : ۲	
دانش آموزان روزانه ، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور (شهریور ماه) سال ۱۳۹۲	مرکز سنجش آموزش و پرورش	http://aee.medu.ir	

ردیف	سؤالات	( پاسخ نامه دارد)	نمره
۱	درست یا نادرست بودن هریک از موارد زیر را مشخص کنید. الف) اگر $A'$ متمم پیشامد $A$ باشد، آنگاه $A'$ زمانی رخ می دهد که $A$ رخ ندهد. ب) در فضای نمونه ای پرتاب یک تاس، پیشامد رو شدن عددی بزرگتر از ۶ ، یک پیشامد حتمی است . ج) دامنه ی تابع $f(x) = \tan x$ برابر است با : $D_f = \left\{ x \in R \mid x = k\pi + \frac{\pi}{2} \right\}$		۰/۷۵
۲	خانواده ای دارای سه فرزند است. اگر $A$ پیشامد هم جنس بودن دو فرزند اول و $B$ پیشامد وجود یک فرزند پسر در این خانواده باشد : الف) فضای نمونه ای این آزمایش تصادفی را مشخص کنید. ب) پیشامد های $A$ و $B$ را مشخص کنید. ج) آیا دو پیشامد $A$ و $B$ ناسازگارند؟ چرا؟		۱/۷۵
۳	از جعبه ای که شامل ۵ مهره ی قرمز و ۴ مهره ی آبی است ، ۳ مهره به تصادف خارج می کنیم. مطلوب است : الف) هر سه مهره هم رنگ باشند. ب) دو مهره آبی و یک مهره قرمز باشند.		۱/۷۵
۴	اگر $A = \left\{ x \in R \mid \frac{2x-2}{3} \geq -2 \right\}$ و $B = \{ x \in R \mid -3 < x \leq 7 \}$ باشد، مجموعه های زیر را به وسیله ی بازه نمایش دهید. الف) $A$ ب) $B$ ج) $A - B$ د) $A \cap B$		۱/۲۵
۵	به ازای چه مقدار $k$ معادله ی $\frac{1}{x-2} + \frac{8}{k} = \frac{3x}{x+2}$ دارای جواب $x=1$ است ؟		۰/۷۵
۶	درستی تساوی مقابل را ثابت کنید : $\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \tan \frac{x}{2}$		۰/۷۵
۷	توابع $f(x) = x + 5$ و $g(x) = \frac{4x}{x^2 - 7x}$ داده شده اند. الف) دامنه ی تابع $\frac{g}{f}$ را به دست آورید. ب) حاصل $(f.g)(1)$ را تعیین کنید.		۱/۷۵
«ادامه ی سؤالات در صفحه ی دوم»			

سؤالات امتحان نهایی درس: ریاضی (۳)	رشته‌ی: علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۹۲ / ۶ / ۶	تعداد صفحه: ۲	
دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور (شهریور ماه) سال ۱۳۹۲	مرکز سنجش آموزش و پرورش	<a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	

ردیف	سؤالات	(پاسخ نامه دارد)	نمره
۸	اگر $f(x) = x + a$ و $g(x) = x^2 + bx$ باشد، $a$ و $b$ را طوری تعیین کنید که داشته باشیم:	$(f \circ g)(x) = x^2 + 4x + 1$	۱
۹	تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & x \geq 1 \\ x & x \leq 0 \end{cases}$ داده شده است. الف) نمودار تابع $f$ را رسم کنید. ب) مقدار $f(f(1))$ را به دست آورید.		۱/۲۵
۱۰	با استفاده از نمودار زیر، حدهای خواسته شده را (در صورت وجود) محاسبه کنید. الف) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$ ب) $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ ج) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$		۰/۷۵
۱۱	حدهای زیر را حساب کنید. الف) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x^2 - 5x + 4}$ ب) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{5}} \frac{\sin(\Delta x - \pi)}{x - \frac{\pi}{5}}$ ج) $\lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{4}{(x - 6)^2}$ د) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x + 7x^2}{3x^2 + x - 4}$		۳
۱۲	مقدار $a$ و $b$ را طوری بیابید که تابع $f(x) = \begin{cases} bx - 1 & x < 3 \\ 5 & x = 3 \\ x + a & x > 3 \end{cases}$ در نقطه‌ی $x = 3$ پیوسته باشد.		۱/۲۵
۱۳	مشتق توابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست) الف) $f(x) = (2x^3 - x + 7)(\sin x)$ ب) $g(x) = \frac{3}{x^2 + 4x}$ ج) $k(x) = \sqrt{x^2 + 2x^2 + 6}$ د) $h(x) = \tan^3(2x) - 2 \cot(x)$		۳
۱۴	معادله‌ی حرکت یک متحرک روی یک خط مستقیم به صورت $f(t) = 2t^2 - 5t + 1$ است. سرعت متوسط این متحرک را در فاصله‌ی زمانی $t_1 = 0$ و $t_2 = 3$ تعیین کنید.		۱
	«موفق باشید»	جمع نمره	۲۰


باسمه تعالی

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی (۳)	رشته‌ی : علوم تجربی
سال سوم آموزشی متوسطه	تاریخ امتحان : ۱۳۹۲ / ۶ / ۶
دانش‌آموزان روزانه ، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور (شهریور ماه ) سال ۱۳۹۲	مرکز سنجش آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف ( درست (۰/۲۵)      ب ( نادرست (۰/۲۵)      ج ( نادرست (۰/۲۵)	۰/۷۵
۲	الف (۰/۷۵) $S = \{ (د, د, د), (د, د, پ), (د, پ, د), (پ, د, د), (پ, پ, د), (پ, د, پ), (د, پ, پ), (پ, پ, پ) \}$ ب (۰/۲۵) $A = \{ (پ, پ, پ), (پ, پ, د), (د, د, د), (د, پ, د) \}$ $B = \{ (د, پ, د), (د, د, پ), (د, د, د), (پ, د, د) \}$ (۰/۲۵) ج $A \cap B = \{ (د, پ, د) \}$ د $A \cap B \neq \emptyset$ (۰/۲۵) $\Rightarrow A$ و $B$ ناسازگار نیستند (۰/۲۵)	۱/۷۵
۳	الف $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\binom{۵}{۳} + \binom{۴}{۳}}{\binom{۹}{۳}} = \frac{۱۴}{۸۴}$ (۰/۲۵) ب $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{\binom{۴}{۲} \binom{۵}{۱}}{\binom{۹}{۳}} = \frac{۳۰}{۸۴}$ (۰/۲۵)	۱/۷۵
۴	الف $A = [-۲, +\infty)$ (۰/۲۵) و $۲x - ۲ \geq -۶ \Rightarrow ۲x \geq -۴ \Rightarrow x \geq -۲$ (۰/۲۵) ب $B = (-۳, ۷]$ (۰/۲۵)      ج $A - B = (۷, +\infty)$ (۰/۲۵)      د $A \cap B = [-۲, ۷]$ (۰/۲۵)	۱/۲۵
۵	$-۱ + \frac{\lambda}{k} = ۱$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \frac{\lambda}{k} = ۲$ (۰/۲۵) $\Rightarrow k = ۴$ (۰/۲۵)	۰/۷۵
۶	$\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{۲ \sin \frac{x}{۲} \cos \frac{x}{۲}}{۲ \cos^2 \frac{x}{۲}} = \frac{\sin \frac{x}{۲}}{\cos \frac{x}{۲}} = \tan \frac{x}{۲}$ (۰/۲۵)	۰/۷۵
	« ادامه در صفحه ی دوم »	

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی (۳)	رشته‌ی: علوم تجربی
سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۹۲/۶/۶
دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور (شهریور ماه) سال ۱۳۹۲	مرکز سنجش آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
------	---------------	------

۷	<p>الف) <math>D_f = R</math> (۰/۲۵) و <math>D_g = R - \{0, 7\}</math> (۰/۲۵)</p> <p><math>D_{\frac{g}{f}} = D_f \cap D_g - \{x   f(x) = 0\} = R - \{0, -5, 7\}</math> (۰/۲۵)</p> <p>ب) <math>(f \cdot g)(1) = f(1) \times g(1) = 6 \times \left(\frac{-4}{6}\right) = -4</math> (۰/۲۵)</p>	۱/۷۵
۸	<p><math>(f \circ g)(x) = x^2 + bx + a</math> (۰/۲۵)</p> <p><math>x^2 + bx + a = x^2 + 4x + 1</math> (۰/۲۵) <math>\Rightarrow a = 1</math> (۰/۲۵) و <math>b = 4</math> (۰/۲۵)</p>	۱
۹	<p>الف) </p> <p>رسم سهمی (۰/۵)</p> <p>رسم خط (۰/۲۵)</p> <p>ب) <math>f(f(1)) = f(0) = 0</math> (۰/۲۵)</p>	۱/۲۵
۱۰	<p>الف) <math>\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 2</math> (۰/۲۵) ب) <math>\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 1</math> (۰/۲۵) ج) <math>\lim_{x \rightarrow -2} f(x)</math> وجود ندارد (۰/۲۵)</p>	۰/۷۵
۱۱	<p>الف) <math>\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x^2-5x+4} \times \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(x-4)(\sqrt{x}+1)} = -\frac{1}{6}</math> (۰/۲۵)</p> <p>ب) <math>\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{5}} \frac{\sin(5x-\pi)}{x-\frac{\pi}{5}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{5}} \frac{5\sin(5x-\pi)}{5x-\pi} = 5</math> (۰/۲۵)</p> <p>ج) <math>\lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{4}{(x-6)^2} = \frac{4}{0^+} = +\infty</math> (۰/۲۵)</p> <p>د) <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^2+7x^2}{3x^2+x-4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{13x^2}{3x^2} = \frac{13}{3}</math> (۰/۲۵)</p>	۳
	« ادامه در صفحه ی سوم »	

باسمه تعالی

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی (۳)	رشته‌ی : علوم تجربی
سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان : ۱۳۹۲/۶/۶
دانش‌آموزان روزانه ، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور (شهریور ماه ) سال ۱۳۹۲	مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۲	$\lim_{x \rightarrow 3^-} (bx - 1) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x + a) = f(3) \quad (./25)$ $3b - 1 = 3 + a = 5 \Rightarrow a = 2 \quad (./25), b = 2 \quad (./25)$	۱/۲۵
۱۳	<p>الف) <math>f'(x) = (6x^2 - 1)(\sin x) + (\cos x)(2x^3 - x + 7)</math> (./۲۵) (./۲۵) (./۲۵)</p> <p>ب) <math>g'(x) = \frac{(x^2 + 4x) - (2x + 4)(3)}{(x^2 + 4x)^2}</math> (./۲۵) (./۲۵)</p> <p>ج) <math>k'(x) = \frac{3x^2 + 4x}{2\sqrt{x^3 + 2x^2 + 6}}</math> (./۲۵)</p> <p>د) <math>h'(x) = 6 \tan^2 2x(1 + \tan^2 2x) + 2(1 + \cot^2 x)</math> (./۵) (./۵)</p>	۳
۱۴	$\frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{4 - 1}{3} = 1 \quad (./25)$ (./۲۵) (./۵)	۱
	جمع نمره	۲۰

باسلام و خسته نباشید، مصححین محترم ، لطفاً برای راه حل های درست دیگر بارم را به تناسب تقسیم نمایند.